




## **Postrzeganie preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy**



Sequence HC Partners Sp. z o.o.  
ul. Górczewska 30; 01-147 Warszawa; tel.: (22) 886 47 15; fax: (22) 638-21-29

*Badamy, by znaleźć rozwiązanie...* [www.sequence.pl](http://www.sequence.pl)

*Niniejsze studium zostało przygotowane przez firmę Sequence HC Partners Sp. z o.o. Firma Sequence HC Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.*

*Cytowanie danych dozwolone wyłącznie za podaniem źródła; publikowanie danych i opinii z niniejszego raportu lub powielanie w części lub całości w każdej postaci dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Sequence HC Partners Sp. z o.o.*

## SPIS TREŚCI

CEL I METODOLOGIA BADANIA .....	4
INDEKS I MAPA PERCEPCJI .....	5
PODSUMOWANIE.....	7
WYNIKI BADANIA .....	13
I. INFORMACJE O RESPONDENTACH.....	13
II. LECZENIE KANDYDOZY POCHWY I SROMU.....	14
2.1. POTENCJAŁ BADANYCH LEKARZY .....	14
2.1.1. Inicjacja i kontynuacja leczenia .....	14
2.1.2. Ostra, nawracająca i wielogniskowa kandydoza pochwy i sromu.....	16
III. PREPARATY STOSOWANE W LECZENIU KANDYDOZY POCHWY I SROMU .....	17
3.1. Postać preparatu od jakiej Lekarz rozpoczyna leczenie.....	17
3.2. Znajomość preparatów doustnych .....	18
3.3. Doświadczenie ze stosowaniem preparatów doustnych .....	20
3.4. Preparaty najczęściej stosowane w leczeniu ostrej kandydozy pochwy .....	21
3.4.1. Wysokość dawki .....	22
3.4.2. Czas trwania terapii .....	23
3.5. Preparaty najczęściej stosowane w leczeniu nawracającej kandydozy pochwy.....	24
3.5.1. Wysokość dawki .....	25
3.5.2. Czas trwania terapii .....	26
3.6. Preparaty najczęściej stosowane w leczeniu wielogniskowej kandydozy pochwy .....	27
3.6.1. Wysokość dawki .....	28
3.6.2. Czas trwania terapii .....	29
IV. WYBÓR PREPARATU .....	30
4.1. Cechy preparatu istotne przy wyborze leku .....	30
4.2. Cechy pacjentki istotne przy wyborze leku .....	31
V. OCENA I PERCEPCJA PREPARATÓW .....	32
5.1. Istotność cech.....	32
5.2. Pozycjonowanie preparatów.....	34
VI. POZYCJONOWANIE FIRM FARMACEUTYCZNYCH .....	50

## CEL I METODOLOGIA BADANIA

### **Badanie postrzegania preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy i sromu**

Badanie zostało przeprowadzone w lutym/marcu 2012 w miastach wojewódzkich.

#### **Celem badania było:**

- ustalenie zwyczajów terapeutycznych związanych z leczeniem kandydozy pochwy i sromu;
- analiza zakresu doświadczeń lekarzy z preparatami stosowanymi w leczeniu kandydozy pochwy i sromu;
- percepcja oraz ocena wybranych preparatów;
- zbadanie kryteriów wyboru preparatów stosowanych w leczeniu kandydozy pochwy i sromu;
- analiza postrzegania firm farmaceutycznych promujących badane preparaty.


#### **Metodologia badania:**

Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów ankieterskich (FFI) wśród 100 lekarzy Ginekologów. W badaniu uczestniczyli lekarze mający pod swoją opieką pacjentki cierpiące na kandydozę pochwy i sromu.

## 3.4.2 Wysokość dawki

xB7. Proszę powiedzieć jaka jest średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu, jaką przepisuje Pan/i pacjentce z OSTRĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU?

Średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu u pacjentek z OSTRĄ KANDYDOZĄ POCHWY




### 3.4.3 Czas trwania terapii

xB8. A proszę powiedzieć ile średnio trwa terapia najczęściej stosowanym DOUSTNYM preparatem w przypadku pacjentek z OSTRĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU? Wartość proszę podać w dniach.

#### Średni czas trwania terapii najczęściej stosowanym DOUSTNYM preparatem u pacjentek z OSTRĄ KANDYDOZĄ POCHWY


*n=95*




## 3.5.2 Wysokość dawki

xB10. Proszę powiedzieć jaka jest średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu, jaką przepisuje Pan/i pacjentce z NAWRACAJĄCĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU?

Średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu u pacjentek z NAWRACAJĄCĄ KANDYDOZĄ POCHWY



Najczęściej przepisywana dawka [mg] w przypadku preparatów...




Badamy, by znaleźć rozwiązanie...

### 3.5.3 Czas trwania terapii

xB11. A proszę powiedzieć ile średnio trwa terapia najczęściej stosowanym DOUSTNYM preparatem w przypadku pacjentek z NAWRACAJĄCĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU? Wartość proszę podać w dniach.

Średni czas trwania terapii najczęściej stosowanym DOUSTNYM preparatem u pacjentek z NAWRACAJĄCĄ KANDYDOZĄ POCHWY

*n=80*






## 3.6.2 Wysokość dawki

xB13. Proszę powiedzieć jaka jest średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu, jaką przepisuje Pan/i pacjentce z WIELOOGNISKOWĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU?

**Średnia wysokość dawki najczęściej stosowanego DOUSTNEGO preparatu u pacjentek z WIELOOGNISKOWĄ KANDYDOZĄ POCHWY**



### 3.6.3 Czas trwania terapii

xB14. A proszę powiedzieć ile średnio trwa terapia najczęściej stosowanym DOUSTNYM preparatem w przypadku pacjentek z WIELOOGNISKOWĄ KANDYDOZĄ POCHWY I SROMU? Wartość proszę podać w dniach.

